DATOS PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS TENEBRIONIDOS DEL MEDITERRANEO OCCIDENTAL

POR

FRANCISCO ESPAÑOL COLL

XII.—UN NUEVO *PLATYOLUS* IBÉRICO

Por mediación de mi buen amigo y conocido lepidopterólogo doctor W. Marten he examinado últimamente una pequeña colección de tenebriónidos ibéricos, reunida por el señor Zur Strassen en el curso de una prolongada campaña entomológica por Andalucía y Levante.

Entre el material estudiado figura un curioso *Platyolus* relacionado con *lapidarius* Reitt., pero con algunas particularidades que al alejarle de éste justifican su aislamiento subespecífico.

Platyolus lapidarius subsp. **strasseni** nov.

Long., 8,5-9,5 mm.

Difiere del *lapidarius* típico por la talla media algo más pequeña, y, especialmente, por la escultura de la parte superior del cuerpo, mucho más atenuada: la puntuación de la cabeza menor, poco o nada estrigosa; la del protórax también menor, no o apenas confluente en el disco; las estrías de los élitros superficiales y formadas por series longitudinales de puntos aislados, más bien pequeños y poco profundos; los intervalos planos, incluso los laterales.

En *lapidarius* típico la talla media es sensiblemente mayor (9,5 a 11 mm.; la puntuación de la cabeza muy fuerte y estri-

gosa; la del protórax mayor y confluente longitudinalmente, lo mismo en el disco que en las márgenes; las estrías de los élitros más profundas, y con los puntos mayores y más hundidos; y, sobre todo, los intervalos de los mismos convexos, convexidad muy realzada en los laterales. El órgano copulador ♂ es idéntico en ambas formas.

El contorno del protórax con la máxima anchura en el medio, más fuertemente escotado ante los ángulos posteriores; éstos, rectos; los puntos de las estrías bastante menores y menos profundos; los intervalos planos y desprovistos de gránulos le separan de *furvus* Muls. y Rey, único de los restantes *Platyolus* con el que podría, al primer examen, confundirse.

Por la talla, aspecto general y escultura del cuerpo recuerda mucho a *Eumicrositus laufferi* Reitt., del que difiere, ante todo, por las protibias con la escotadura apical casi cortada verticalmente y sin afectar la parte superior de la tibia, con la cual viene limitada por un borde muy vivo; carácter, éste, que le sitúa en agrupación subgenérica distinta.

Andalucía. Sierra Harana, 1.100 m., en la prov. de Granada, 20-IX-53 (Zur Strassen leg.); 4 ejemplares (col. Zur Strassen y col. Museo de Ciencias Naturales de Barcelona).

XIII.—NOTA SINONIMICA

Con el nombre de *Moralesia* describió Kaszab [1] en 1944 (*EOS*, vol. XX, pág. 18) un nuevo género de *Opatrini* (col.) del Sáhara atlántico, pero poco antes (1943) Fowler había utilizado el mismo nombre para un género de peces (*Bol. Mus. Hist. Nat.*, «Javier Prado», vol. VII, pág. 96, Lima), como puede comprobarse en el *Nomenclator Zoologicus* de S. A. Neave, vol. V (1936-1945), pág. 163, Londres, 1950. Para *Moralesia* Kaszab nec Fowler propongo el nombre *Moragacinella* n. n.

[1] Y no Español, como señala erróneamente el *Nomenclator Zoologicus* arriba citado.